Блеоцин — Bleocin (Блеомицин) лиоф.д/ин.15 мг фл.№1

Рак кожи, рак ротовой полости, языка и губ, карцинома глотки и гортани, рак легкого (особенно плоскоклеточный), карцинома пищевода, щитовидной железы, рак шейки матки, ретикулосаркома, лимфосаркома, болезнь Ходжкина, глиома.

Действующее вещество: Блеомицин* (Bleomycin*)
Аналоги по АТХ: L01DC01 Блеомицин
Фармакологическая группа: Противоопухолевые антибиотики

Нозологическая классификация (МКБ-10), список кодов МКБ-10:

- C15-C26 Злокачественные новообразования органов пищеварения
- C30-C39 Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки
- C44 Другие злокачественные новообразования кожи
- C53 Злокачественное новообразование шейки матки
- C71 Злокачественное новообразование головного мозга
- C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы
- C81 Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз]
- C85.0 Лимфосаркома

Состав и форма выпуска

1 ампула с порошком для приготовления инъекционного раствора содержит блеомицина гидрохлорида 15 мг; в упаковке 1 шт.

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие — цитостатическое, противоопухолевое.

Вызывает фрагментацию ДНК, блокирует синтез белка и угнетает рост клеток.

Фармакодинамика

Наряду с противоопухолевой обладает слабо выраженной миело- и иммунодепрессивной активностью.

Показания препарата Блеоцин

Рак кожи, рак ротовой полости, языка и губ, карцинома глотки и гортани, рак легкого (особенно плоскоклеточный), карцинома пищевода, щитовидной железы, рак шейки матки, ретикулосаркома, лимфосаркома, болезнь Ходжкина, глиома.

Противопоказания

Гиперчувствительность, фиброз легких и легочная недостаточность, заболевания сердца, почечная недостаточность.

Побочные действия

Интерстициальная пневмония, фиброз легких; редко — головная боль, понижение аппетита, диарея, олигурия, лейкопения, аллергические реакции (кожные высыпания, гипертермия, анафилактический шок).

Взаимодействие

Другие противоопухолевые средства, лучевая терапия повышают вероятность развития побочных эффектов.

Способ применения и дозы

Парентерально (предварительно растворяют в 5–20 мл изотонического раствора): в/в (медленно) и в/м — по 15–30 мг, п/к — по 1 мг, в/а — по 5–15 мг; вводят обычно 2 раза в неделю (возможно ежедневно или 1 раз в неделю).

Курсовая доза — не более 300 мг.

Меры предосторожности

Следует с осторожностью (под врачебным контролем, с уточнением дозы и др.) назначать пациентам при воспалительных заболеваниях легких, патологии почек и печени, беременности, в пожилом (старше 60 лет) возрасте, получающим лучевую терапию или др. противоопухолевые препараты.

Условия хранения препарата Блеоцин

В сухом, защищенном от света месте, при температуре 2–8 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Блеоцин

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.